



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



WETLANDS OF BURDUR PROVINCE BURDUR İLİ SULAK ALANLARI

Burdur Gölü

Lake Burdur



- Tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Güncel rakımı 840,5 m, yüzey alanı yaklaşık 125 km², hacmi 4 milyar 195 milyon m³, en derin yeri yaklaşık 60 m'dir.
- Türkiye'nin ikinci büyük sodalı, Dünyanın ilk on tuzlu gölü arasında yer alır.
- Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olup, I. Derece Doğal Sit Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Ulusal Sulak Alan statüleri altında tanınmakta ve korunmaktadır.
- Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan Dikkuyruk ördeği (*Oxyura leucocephala*) nin en önemli kışlama alanı olup, göl ve çevresinde toplam 281 kuş türü bulunduğu tespit edilmiştir.
- Gölün dip suları, ötrofik düzeyde olduğu için canlı yaşamını sınırlar.
- Dünya'da yalnızca bu gölde yaşayan, *Aphanius sureyanus* gölün yegane balık türü olup, popülasyon düzeyi yüksektir.
- Dünya'da yalnız bu gölde yaşayan, omurgasızlardan 1-2 mm büyüklüğündeki *Arctodiaptomus burduricus* gölün en baskın zooplanktonik organizmasıdır.
- Göl suyunun çekilmesiyle oluşan kurak alanlar; tuzcul bitkilerin yoğun olarak yetiştiği bir ortamdır.
- Gölün ekolojik yönden iklimi dengelemesi ve biyoçeşitliliği desteklemesinin yanı sıra; turizm gibi sosyo-ekonomik yönlerden de faydası vardır.

- It was formed as a result of tectonic movements. Its current altitude is 840.5 m, surface area is about 125 km², its volume is 4 billion 195 million m³ and the deepest location is about 60 m.
- It is the second largest soda lake in Turkey, while it is among the world's top ten salty lakes.
- It is one of Turkey's 14 Ramsar sites and is recognized and protected under First Degree Natural Protected Area, Wildlife Development Area and National Wetland Area status.
- It is the most important wintering area of the globally-endangered white-headed duck (*Oxyura leucocephala*) and a total of 283 bird species have been determined in and around the lake.
- The bottom waters of the lake limits the life as it is in eutrophic level.
- *Aphanius sureyanus*, which lives only in this lake, is the only fish species of the lake and its population level is high.
- *Arctodiaptomus burduricus*, which is 1-2 mm in size and is one of the invertebrates and which lives only in this lake, is the most dominant zooplanktonic organism of the lake.
- The arid areas formed by the withdrawal of lake water is an environment where halophilic plants grow intensely.
- In addition to ecologically balancing the climate and supporting the biodiversity, the lake has also some socio-economic benefits such as tourism.



Dikkuyruk ördeği
White-headed Duck
Oxyura leucocephala

Burdur Gölü, endemik ve nesli tehlikedeki türleri barındırması nedeniyle biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir sulak alandır. Dünya genelinde nesli tehlikede olan dikkuşluk ördeklerinin (*Oxyura leucocephala*) 2010 yılına kadar yaklaşık %70'inin kışladığı uluslararası öneme sahip, ülkemizin 14 Ramsar alanından biridir. Son yıllarda gölde kışlayan dikkuşluk ördeği sayısı iyice azalmasına karşılık, bu kadim ziyaretçileri hala izlemek ve fotoğraflamak mümkündür.

Lake Burdur is an important wetland area for biodiversity because it contains endemic and endangered species. It is one of the 14 Ramsar sites of our country, having an international importance, where nearly 70% of the globally endangered white-headed duck (*Oxyura leucocephala*) stay in winter, by 2010. Although the number of wintering white-headed ducks in the lake has decreased considerably in recent years, it is still possible to observe and photograph these ancient visitors.

Burdur Gölü ve çevresinde 283 farklı kuş türü tespit edilmiştir. 283 different bird species have been identified in Lake Burdur and its vicinity.			
			
Sukuşu Waterfowl	Ötücü Songbird	Yırtıcı Raptor	
93	148	35	

Göl suları kış aylarında donmadığından birçok ördek türü göl üzerinde kalabalık topluluklar oluşturmaktadır. Macar ördeği, elmabaş patka, tepeli patka, kıkkuşluk, kaşıkgağa, sakarca, akkuşluklu kartal gibi türler göl ve çevresinde kışlayan önemli türlerdir. Mahmuzlu kız kuşu, şahin, angıt, küçük halkalı cıbrıt, kulaklı orman baykuşu, kocagöz, uzunbacak ve bahri gibi türlerde yine göl çevresini üremek için kullanan türler arasındadır.

Özellikle gölün kuzey ve doğu kıyılarında yoğunlaşan kuş popülasyonu, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıların ilgisini çekmektedir.


The bird population, especially concentrated on the northern and eastern shores of the lake, attracts the attention of birdwatchers and nature photographers.



Çakal
Golden Jackal
Canis aureus



Su yılanı
Dice Snake
Natrix tessellata



Erguvani balıkcıl
Purple Heron
Ardea purpurea



Lıdıya yalancı cadısı
Lydian Tawny Rockbrown
Pseudochazara lydia



Ankuşu
European Bee-eater
Merops apiaster




Küçük ateş
Lesser Fiery Copper
Lycaena thersamon



Dikenli keler
Roughtail Rock Agama
Stellagama stellio



Vaşak
Eurasian Lynx
Lynx lynx



Büyük sevbeni
Ilex Hairstreak
Satyrium ilicis



Küçük ak balıkcıl
Little Egret
Egretta garzetta

Alan Aktiviteleri:

Kano
Bisiklet
Çadır/Karavan Kampı
Doğa Fotoğrafçılığı
Doğa Yürüyüşü
Kuş Fotoğrafçılığı
Yamaç Paraşütü
Lisinia Doğa Merkezi
Kuyucak Köyü Lavanta Tarlaları
Saracık Köyü Gül Bahçeleri

Area Activities

Canoeing
Bicycling
Tent / Caravan Camp
Nature Photography
Hiking
Bird Photography
Paragliding
Lisinia Nature Centre
Lavender Fields in Kuyucak Village
Rose Gardens in Saracık Village



SOĞANLI SAZLIĞI
SOĞANLI REED BED

Çorak (Bayındır) Gölü

Lake Çorak (Bayındır)

Alan Aktiviteleri:

Bisiklet
Çadırli Kamp
Doğa Fotoğrafçılığı
Doğa Yürüyüşü
Kuş Fotoğrafçılığı

Area Activities:

Bicycling
Tent-Camping
Nature Photography
Hiking
Bird Photography

Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Bayındır Köyü, Dereköy, Aşağıkırkl Köyleri sınırları içerisinde kuzeyindeki dik dağlar ile Denizli Acı Göl'e komşu olan tektonik-karstik oluşumlu, sıg ve suyu hafif tuzlu ve mevsimlik (geçici) bir göldür. Kimileri Bayındır Köyü kenarında bulunduğuundan "Bayındır Gölü", kimileri göl tabanının beyaz renginden dolayı "Akgöl", Kimileri de yaz mevsiminde sularının tamamen kuruması nedeniyle "Çorak Göl" demektir.

Yaklaşık yüzey alanı 12 km² olan bu gölümüz, 1970'li yıllarda, tarım alanı olarak kullanılması amacıyla, açılan düdenler ile gölün suları kuzeyinde bulunan Acıgöl havzasına boşaltılarak kurutulmuştur. Günümüzde en fazla 50 cm kadar yükselebilen sular en geç Haziran ayında tamamen kurumaktadır. Gölün suyu az olsa da, özellikle ilkbahar aylarında su kuşları için adeta bir vahayı andırmaktadır. Göl, çok sayıda yerli kuş türü dışında, su tuttuğu dönemlerde binlerce flamingo başta olmak üzere, angit, çamurcun, elmbaş patka, pasbaş patka gibi kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Gölü besleyen bazı derelerde, Dünya'da sadece bu gölde yaşayan endemik bir balık türü olan *Pseudophoxinus mehmeti* (ot balığı) yaşamaktadır.

Çorak Göl alt havzasında 135 farklı kuş türü tespit edilmiştir. 135 different bird species have been identified in Lake Çorak sub-basin.



Sukusu
Waterfowl
31



Ötücü
Songbird
90



Yırtıcı
Raptor
14

It is a tectonic-carstic formed, shallow and slightly salty and seasonal (temporary) lake adjacent to Denizli Acı Lake and next to the steep mountains to the north within the borders of the Aşağıkırkl Village, Dereköy and Bayındır Village in Yeşilova District of Burdur Province. Some name it "Bayındır Lake" as it is located on the edge of Bayındır Village, some name "Akgöl" because of the white colour of the lake floor, and some call "Lake Çorak (Arid)" because its waters completely dry out in summer.

This lake, which has a surface area of approximately 12 km², was dried by means of draining into Acıgöl located in the lake's basin and due to the carst lakes opened, in 1970s, to be used as an agricultural area. Today, the water can rise up to 50 cm and it dries completely in June at the latest. Although the water of the lake is little, it resembles an oasis for waterfowls, especially in spring. In addition to a large number of species of native birds, the lake hosts bird species such as ruddy shelduck, common teal, common pochard and ferruginous duck and especially thousands of greater flamingos in the period when water amount is plenty.

In some rivers that feed the lake, *Pseudophoxinus mehmeti* an endemic fish species living only in this lake, lives.

Kukumav
Little Owl
Athene noctua




Angit
Ruddy Shelduck
Tadorna ferruginea



Suna
Common Shelduck
Tadorna tadorna



Çakal
Jackal
Canis aureus




Kaya sıvacıkuşu
Western Rock Nuthatch
Sitta neumayer



Florya
European Greenfinch
Chloris chloris



Erguvani balıkcıl
Purple Heron
Ardea purpurea



İspinoz
Common Chaffinch
Fringilla coelebs




Bahçe kirazkuşu
Cirl Bunting
Emberiza ciris



Flamingo
Greater Flamingo
Phoenicopterus roseus



Uzunbacak
Black-winged Stilt
Himantopus himantopus



Göhlisar Gölü

Lake Göhlisar

Alan Aktiviteleri:

Kuş Gözlemi

Olta Balıkçılığı

Kamp

Doğa Yürüyüşü

Doğa Fotoğrafçılığı

Area Activities:

Bird Watching

Angling

Camp

Hiking

Nature Photography

Yamadı Gölü adıyla da bilinen bu göl, Göhlisar İlçesi sınırları içerisinde, Dalaman Çayı'nın getirdiği alüvyonların oluşturduğu bir alüvyon set gölüdür. Gölün adı aynı zamanda, kıyısında yer alan köylere itafen, Yamadı Gölü ve Uylupınar Gölü olarak da anılır.

Gölümüzün yüzey alanı 5 km², denizden yüksekliği 1000 m, en derin yeri 6 m ve ortalama derinliği 3 m kadardır. Siğ bir tatlısu gölüdür. Çevresindeki çok sayıda daimi kaynak suları haricinde, Yapraklı Barajı'ndan bırakılan sular, ve Hisarardı Deresi'yle beslenir. Kıyı kesimleri yoğun kamışlık ve sazlık alanlar ile çevrilidir. Göl içinde rüzgâra göre yer değiştiren yüzer bitki adacıkları bulunmaktadır. Ayrıca göl tabanı tamamen su altı bitkileri ile kaplıdır.

This lake, also known as Yamadı Lake, is an alluvial set lake formed by alluviums brought by Dalaman Stream located within the boundaries of Göhlisar District. The name of the lake is also referred to as Yamadı Lake and Uylupınar Lake, dedicated to the villages on its shore.

The surface area of our lake is 5 km², the altitude is 1000 m, the deepest place is 6 m and the average depth is 3 m. It is a shallow freshwater lake. Apart from the numerous permanent spring waters in the vicinity, it is fed by the waters released from the Yapraklı Dam and by the Hisarardı Stream. The coastal areas are surrounded by dense reeds and morasses. There are islets of plants floating according to the wind, in the lake. Also the base of the lake is completely covered with underwater plants.

Göhlisar Gölü alt havzasında 117 farklı kuş türü tespit edilmiştir.
117 different bird species have been identified in Göhlisar Lake sub-basin.



Sukusu
Waterfowl

32



Ötücü
Songbird

74



Yırtıcı
Raptor

11

Alanda görülen sokuşlarının sonbahar döneminde alandaki görülme sıklığına bakıldığında ilk 3 sırada Sakarmekke, Yeşilbaş ve Fiyu yer almaktadır.

Ayrıca 18 farklı kelebek türüne rastlanmıştır.

In terms of the frequency of waterfowl encountered here in autumn; common coot, mallard and eurasian wigeon rank the top three.

In addition, 18 different butterfly species were seen.



Leylek
White Stork
Ciconia ciconia




Benekli bakır
Small Copper
Lycaena phlaeas



Çokgözlü esmer
Brown Argus
Polyommatus agestis



Vaşak
Eurasian Lynx
Lynx lynx




Küçük ak balıkçıl
Little Egret
Egretta garzetta



Saztavuğu
Common Moorhen
Gallinula chloropus




Sarı antenli zıpzıp
Small Skipper
Thymelicus sylvestris



Çakal
Golden Jackal
Canis aureus



Ak kuyruksallayan
White Wagtail
Motacilla alba



Angit
Ruddy Shelduck
Ralloma ferruginea



Himalaya mavisi
Eastern Baton Blue
Pseudophilotes vicrama



Boğmaklı toygar
Calandra Lark
Melanocorypha calandra

Karataş Gölü

Lake Karataş

Alan Aktiviteleri:

Bisiklet
Çadırli Kamp
Doğa Fotoğrafçılığı
Doğa Yürüyüşü
Kuş Fotoğrafçılığı

Area Activities:

Bicycling
Tent-Camping
Nature Photography
Hiking
Bird Photography

Burdur şehrinin güneyinde, Tefenni Ovası'nın kuzeydoğusunda yer alan 11,9 km² yüzey alanına sahip sığ bir tatlısu gölüdür. Eskiden küçük bir sulak alan ve Bahçeözü Gölü olarak da bilinen yer, 1970'li yıllarda güney kısmında yapılan büyük bir sedde ile göle dönüştürülmüştür. Esas amacı su depolama olan bu ekosistem, kuzey ve batı taraflarında gelişen yoğun kamışlık, zengin sualtı bitki gelişimi ve sığ olması nedeniyle su kuşları için bir cazibe merkezi olmuştur. Gölde başta Çinsazanı (Gümüşü havuzbalığı), Sazan ve Sudak olmak üzere toplam 7 tür balık yaşamakta ve ticari balık avcılığı yapılmaktadır.

Göl, su kuşlarının ihtiyaç duyduğu beslenme imkanları ve barınma alanlarına sahip olması nedeniyle her mevsim binlerce sukusunu ağırlar. Bu nedenle Karataş Gölü 2006 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edilmiştir. Alanda bulunan türlerden 76 tanesi Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altındadır.

Karataş Gölü alt havzasında 86 familyaya ait 434 bitki türü belirlenmiştir. Kindıra kofası (*Juncus sparganiifolius*), kuş geveni (*Astragalus brachypterus*), er karanfil (*Dianthus zederbaueri*) ve akırkarha (*Anacyclus latealatus*) endemik bitki türleri bulunmaktadır.

Göl çevresinde, 6 familyaya ait 10 memeli türünün (tilki, tavşan, kurt, çakal, saz kedisi, kirpi, porsuk, yaban domuzu, gelincik, alaca sansar) yaşadığı belirlenmiştir.

Çakal
Golden Jackal
Canis aureus

Fiyu
Eurasian Wigeon
Anas penelope



Sukusu
Waterfowl
61



Ötücü
Songbird
48



Yırtıcı
Raptor
13

It is a shallow freshwater lake with a surface area of 11.9 km², located to the northeast of the Tefenni Plain, south of the city of Burdur. Formerly a small wetland and known as Bahçeözü Lake, it was transformed into a lake with a large impoundment built in the south in 1970s. This ecosystem, whose main purpose is to collect water, has been a centre of attraction for waterfowl due to its intense reed growing on the north and west sides, rich underwater plant development and shallowness. A total of 7 fish species, especially Gibel carp, common carp and zander, live in the lake and commercial fishing is carried out here.

The lake welcomes thousands of waterfowls in all seasons due to its feeding facilities and shelter areas that waterfowls need. Therefore, Karataş Lake has been declared as Wildlife Development Site in 2006. 76 of the species present in the area are protected under the Bern Convention.

434 plant species belonging to 86 families were identified in the Lake Karataş basin. There are endemic plant species such as *Juncus sparganiifolius*, *Astragalus brachypterus*, *Dianthus zederbaueri* and *Anacyclus latealatus*.

Around the lake, 10 mammal species belonging to 6 families (red fox, European hare, wolf, golden jackal, jungle cat, hedgehog, badger, wild boar, lesser weasel and marbled polecat) were found to live.

Salda Gölü

Lake Salda



Ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyon ovalarıyla çevrilmiş olan Salda Gölü'nün suları tatlı-sodali su sınıfına girmektedir. 184 m derinliği ile Burdur'un en derin, ülkemizin ise üçüncü en derin gölüdür. Oluşumu itibarıyla tektonik (depremsel) kökenli bir göl olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m ve yüz ölçümü 44 km²'dir. Göle 1989 yılında Birinci Derece Doğal Sit Alanı statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin ve Dünyanın en temiz gölleri arasında yer alan Salda Gölü; suyunun berraklığı ve turkuaz rengiyle verdiği güzel manzaranın yanı sıra güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan, çok özel karbeyazı hidromagnezit çökellerinden ve kristal siyahı serpantinit kumullardan oluşan; küçük kumsallar alanın rekreasyon amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. Gölümüz kristal berraklığında suları, çam ormanları ve kamp yerleriyle; yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu, sualtı dalış, yüzme vb. faaliyetlere uygunluğuyla alternatif tatil fırsatları sunmaktadır.


Surrounded by forest-covered hills, rocky terrains and small alluvial plains, the waters of Salda Lake are classified as fresh-soda water. It is the deepest lake in Burdur and the third deepest lake in Turkey with a depth of 184 m. It is a tectonic lake in terms of formation, with an elevation of 1140 m and a surface area of 44 km². The lake was given the status of First Degree Natural Protected Site in 1989.

Salda Lake is one of the cleanest lakes in Turkey and the world; and in addition to beautiful panorama due to its clear and turquoise water, the small beaches located on the southwest and southeast coasts, formed of very special snow-white hydromagnesite deposits and crystal black serpentinite dunes, makes the area suitable for recreation. With its crystal clear waters, pine forests and camping sites; our lake offers alternative holiday opportunities as it is appropriate for sailing, canoeing, windsurfing, photo-safari, lake tour, underwater diving, swimming and similar activities.





Anormal çokgözlü
Anomalous Blue
Polyommatus admetus



Akkuyruklu karial
White Tailed Sea Eagle
Haliaeetus albicilla



Anadolu sıvacı
Krüper's Nuthatch
Sitta krueperi



Maskeli ötlegen
Sardinian Warbler
Sylvia melanocephala




Yeni beneklilemek
Eastern Bath White
Pontia edusa



Kızıl kiraz kuşu
Cretzschmar's Bunting
Emberiza caesia



Çokgözlü anadolu beyazı
Turkish Furry Blue
Polyommatus menalcas



Çokgözlü dafnis
Meleager's Blue
Polyommatus daphnis



Elmabaş patka
Common Pochard
Aythya ferina



Macar ördeği
Red-crested Pochard
Netta rufina



Doğu çayiresmeri
Turkish Meadow Brown
Maniola telmessia



Yeşilbaş
Mallard
Anas platyrhynchos

Salda Gölü'nün ilginç bir özelliği de, gölün su kalitesi ve içinde yaşayan mikroorganizmaların işbirliğinde şekillenen stromatolit kayaları ve hidromagnezit çökellerinin oluşumudur. Bu çökel oluşumları sayesinde göl kendine özgü berraklığa sahiptir. Bu özelliğinin bembeyaz kumsallara dönüşmesi ise harika bir peyzaj oluşturmuştur.

Salda gölü ve çevresinde 151 kuş türü tespit edilmiştir. En sık gözlenen türler arasında sakarmeke, elmabaş patka, çamurcun ve yeşilbaş olduğu görülmektedir. Bölgedeki ötücü kuşlardan anadolu sıvacı, kızıl kiraz kuşu ve maskeli ötlegen gibi Akdeniz ekosistemlerine özgü türlerdir ve alanı kuş gözlem turizmi açısından değerli kılmaktadır.

Tilki, yaban domuzu, yaban tavşanı ve endemik bir kelebek türü olan çokgözlü anadolu beyazı göl çevresinde yaşamaktadır.

The water quality of the lake and the formation of hydromagnesite deposits and stromatolite rocks formed in cooperation of microorganisms living in it, are two of the interesting features of the Salda Lake. Thanks to these sedimentary formations, the lake has its specific clarity. The transformation of this property into white beaches has created a wonderful landscape.

151 bird species were identified in and around Lake Salda. Among the most common species are common coot, common pochard, eurasian teal and mallards. Among the singing birds of the region; Krueper's Nuthatch, Cretzschmar's Bunting and Sardinian Warbler are native to the Mediterranean ecosystems, making the area valuable for birdwatching tourism.

Fox, wild boar, hare and Turkish Furry Blue, an endemic species of butterfly, live around the lake.



YAPMADAN DÖNME

Salda Gölü Tabiat Parkını ziyaret edin!

Beyaz adaları görmeyi unutmayın!

Kuş gözlemi yapın!

Salda Gölü'nün çevresini bisikletle gezin!

Salda Gölü'nü kayak merkezinden seyredin!

DON'T RETURN WITHOUT DOING THESE!

Visit Lake Salda Nature Park!

Don't forget to see the white islands!

Do birdwatching!

Bike around Lake Salda!

Watch Lake Salda from the ski resort!

Yarışlı Gölü

Lake Yarışlı

YAPMADAN DÖNME

Yarışlı Gölü'nün çevresini gezin ve gölü seyredin!
Yarışlı Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapın!
Göl ve çevresinde kuş gözlemi yapın, flamingoların
Muhteşem güzelliğinin farkına varın!
Fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı unutmayın!

DON'T RETURN WITHOUT DOING THESE!

See around Lake Yarışlı and watch the lake!
Go hiking around Lake Yarışlı!
Do birdwatching in and around the lake.
Realize the magnificent beauty of flamingos!
Don't forget to take and share photos!

Yeşilova ve Burdur Merkez ilçe sınırları içinde yer alan, kıyılarında birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanları bulunan, Burdur Gölü'nün güneybatısında, sodyum sülfat-klorür konsantrasyonu yüksek olan, sığ bir göldür.

Oluşum itibarıyla tektonik bir göldür. Yüz ölçümü 14 km² ve deniz seviyesinden yüksekliği 910 m'dir. Gölün beslenimi başta Gümbet Pınarı olmak üzere, göl çevresinde yer alan çok sayıda daimi pınar ve kışları akan Gençali Deresi ile olmaktadır.

Gölün su seviyesi yıl boyunca büyük değişiklikler göstermektedir. Kışları en derin yeri 2 m kadar olan göl, bazı yıllar yazları tamamen kuruyabilmektedir. Göl çevresinde yaz aylarında büyük ölçüde kuruyan geniş kil tavaları, kış aylarında geniş tuzcul bataklıklar ve çamur düzlüklerine dönüşmektedir. Gölün kuzeyindeki ıslak çayırılık tuzlusu habitatı ile gölün güney kıyılarında yoğunluk kazanan sazlık tatlısu habitatı biyolojik çeşitliliğin kaynağıdır.

Yarışlı Gölü sığ bir göl olması nedeniyle, göç dönemlerinde özellikle flamingolar tarafından tercih edilen bir göldür. Zira flamingoların çok sevdiği alg, zooplankton ve sucul böcekler bu gölde yoğun bir gelişim göstermektedir. Gümbet Pınarı mevkinde, Burdur endemiği bir balık türü olan, Burdur otbalığı (*Pseudophoxinus burduricus*) yaşamaktadır.

Yarışlı Gölü çevresinde
156 farklı kuş türü tespit edilmiştir.
156 different bird species have been
identified in Lake Yarışlı sub-basin.



Sukuşu
Waterfowl
53



Ötücü
Songbird
90



Yırtıcı
Raptor
13

It is a shallow lake in the southwest of Lake Burdur, located within the boundaries of Yeşilova and Burdur Central District, with high sodium sulphate-chloride concentration, with first and second degree archaeological protected sites.

In terms of its formation, it is a tectonic lake. Its surface area is 14 km² and its elevation is 910 m ASL. The lake is mainly fed by Gümbet Spring, as well as by numerous permanent springs around the lake and by Gençali Stream flowing in winters.

The water level of the lake varies greatly throughout the year. The deepest part of the lake is 2 m in winters, while it may dry up completely in summer. The large clay pans that dry up largely in summer around the lake turn into large salty marshes and mud plains in winter. The wet meadow salty water habitat to the north of the lake and the freshwater reed habitat that intensifies on the southern shores of the lake are the sources of biodiversity.

As Lake Yarışlı is a shallow lake, it is preferred especially by flamingos during migration periods. Hence, algae, zooplankton and aquatic insects, which flamingos love very much, show an intensive development in this lake. Burdur Spring Minnow (*Pseudophoxinus burduricus*), a fish species endemic for Burdur, lives around the Gümbet Spring.



Boğmaklı toygar
Calandra Lark
Melanocorypha calandra




Mahmuzlu kızkuşu
Spur-winged Lapwing
Vanellus spinosus



Boğmaklı toygar
Calandra Lark
Melanocorypha calandra



Kaya sıvacıkuşu
Western Rock Nuthatch
Sitta neumayer



Suna
Common Shelduck
Tadorna tadorna



Tilki
Red Fox
Vulpes vulpes



Flamingo
Greater Flamingo
Phoenicopterus roseus



Kukumav
Little Owl
Athene noctua



Saztavuğu
Common Moorhen
Gallinula chloropus



Yaban domuzu
Wild Boar
Sus scrofa

Yazır Gölü

Lake Yazır

YAPMADAN DÖNME

Yazır Gölü'nün çevresini gezin!
Gölde yaşayan kuşları gözlemleyin!
Göl çevresindeki kaya resimlerini görün!
Yazır köyünü keşfedin ve odun ateşinde çay için!
Fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı unutmayın!

DON'T RETURN WITHOUT DOING THESE!

See around the Lake Yazır!
Observe the birds living on the lake!
See the rock pictures around the lake!
Explore Yazır Village and enjoy tea by the wood fire!
Don't forget to take and share photos!

Çavdır İlçesi, Yazır Köyü'nün güneybatısında ve 3,2 km uzağında; Anbarcık Köyü'nün ise güneydoğusunda ve 8 km uzağında yer almaktadır. Bu göle ismini veren Yazır Köyü, Meşhur İslam âlimi Elmalılı Hamdi Yazır'ın köyüdür.

Yazır Gölü, Dengere Dağları'nın batı eteklerinde bir çöküntünün suyla dolmasıyla oluşmuştur. Göller Yöresi'nin en küçük ve en yüksek rakımında bulunan Yazır Gölü; 1490 m rakımında ve yaklaşık 2,3 km² yüzey alanına sahip sığ bir tatlısu dağ gölüdür. Gölün neredeyse tamamı yoğun kamış ve saz örtüsü ile kaplanmıştır. Gölün kuzeydoğusunda fazla suların tahliyesini yapan doğal bir düden (gideğen) bulunmaktadır.

En derin yeri 4 m olan gölün dibinde yoğun bir bitki kalıntısı bulunmaktadır. Gölde ekonomik düzeyde balık avcılığı yapılmaz. Birkaç sazan türü ve sivrisinek balığı gölün yegâne balıklarıdır.

Alanda gözlenen bu su kuşlarından, sonbahar döneminde farklı tarihlerde görülen sukuşlarının gözlenme sıklıklarına bakıldığında, ilk sırada ülkemizde en sık görülen bahri, gri balıkçıl ve sakarmekenin olduğu görülmektedir. Çamurcun ve yeşilbaş ise gölde en sık gözlenen ördek türleridir.

Ayrıca yalancı apollo, dağ oyklösü, kleopatra, küçükbeyaz melek ve diken keleşbeği olmak üzere 5 farklı keleşbeğ türü yaşadığı gözlemlenmiştir.

Yazır Gölü çevresinde 84 farklı kuş türü tespit edilmiştir. 84 different bird species have been identified in Lake Yazır sub-basin.



Sukuşu
Waterfowl
15



Ötücü
Songbird
61



Yırtıcı
Raptor
8

It is located 3.2 km southwest of Yazır Village of Çavdır District and 8 km southeast of the village of Anbarcık. Yazır Village, which gives its name to this lake, is the village of Elmalılı Hamdi Yazır, the famous Islamic scholar.

Lake Yazır was formed by a depression filled with water on the western slopes of the Dengere Mountains. Lake Yazır, which is the smallest one and the one located at the highest altitude of the Lakes Region, is a shallow freshwater mountain lake at an altitude of 1490 m with a surface area of approximately 2.3 km². Almost the entire lake is covered with dense reed and straw cover. To the northeast of the lake, there is a natural sinkhole (outlet) which discharges excess water.

At the bottom of the lake, which is 4 m at the deepest point, there are dense plant remains. There is no economic-level fishing in the lake. Several carp species and mosquito fish are the only fish of the lake.

Among the waterfowls observed in the area, in terms of the frequency of encountering waterfowl in different dates in the autumn period, the first ranks in our country are occupied by the great crested grebe, grey heron and common coot. Eurasian teal and mallard are the most commonly observed duck species in the lake.

In addition, it was observed that there were 5 different butterfly species, including false apollo, eastern dappled white, cleopatra, small white and painted lady.



Bahri
Gread Crested Grebe
Podiceps cristatus




Çamurcun
Eurasian Teal
Anas crecca



Küçük beyaz melek
Small white
Pieris rapae



Damalı su yılanı
Dice Snake
Natrix tessellata



Yeşilbaş
Mallard
Anas platyrhynchos

SULAK ALANLARIN 7 HARİKASI


İHTİYACINIZ
OLAN
SUYU
SAĞLAR




SUDAKİ
ZARARLI
ATIKLARI
FİLTRELER



İNSANLIĞA
BESİN
KAYNAĞI
SAĞLAR




BİYOÇEŞİTLİLİĞE
EV SAHİPLİĞİ
YAPAR




SEL
BASKINLARINI
ÖNLER



ANİ
İKLİM
DEĞİŞİKLERİNİ
ÖNLER



SÜRDÜRÜLEBİLİR
GEÇİM
ÜRÜNLERİ
SUNAR



BURDUR İLİ SULAK ALANLARI

📷 Tamer YILMAZ

📍 Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:1 Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü
Burdur Şube Müdürlüğü - Burdur/MERKEZ

☎ 0 248 233 31 43

✉ bolge6.dkmp@tarimorman.gov.tr ✉ burdur.dkmp@tarimorman.gov.tr